

Prevalencia de náusea y vómito postoperatorio en colecistectomía laparoscópica en un tercer nivel de atención

Robles-Espinoza, Gerardo Daniel; Martínez-Ramírez, José Saúl; Torres-Alarcón, Carmen Gabriela

Resumen. La náusea y el vómito son complicaciones frecuentes de la anestesia. Este estudio tiene como objetivo conocer la prevalencia de la náusea y el vómito postoperatorio en colecistectomía laparoscópica en un hospital de tercer nivel de atención para realizar un estudio observacional, descriptivo, prospectivo y longitudinal, en pacientes a quienes se programó para colecistectomía laparoscópica electiva en un hospital.

Abstract. Nausea and vomiting are common side effects of anesthesia. The aim of this study is to estimate the prevalence of post-op nausea and vomiting in laparoscopic cholecystectomy at a third-rate hospital as part of an observational, descriptive, prospective and longitudinal study in patients who had been scheduled for elective laparoscopic cholecystectomy at a hospital.

Referencia bibliográfica.

Robles, G. D.; Martínez, J. S., & Torres, C. G. (2019). Prevalencia de náusea y vómito postoperatorio en colecistectomía laparoscópica en un tercer nivel de atención. *Revista Mexicana de Anestesiología*, 42(1), 19–27. Recuperado de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=84784>